

## **Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika**

### **Rowachol želučanootporne kapsule, meke**

$\alpha$ -pinen,  $\beta$ -pinen, mentol, menton, kamfen, borneol, cineol

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Rowachol i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowachol?
3. Kako uzimati Rowachol?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rowachol?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Rowachol i za što se koristi?**

Rowachol se koristi za razgradnju (otapanje ili raspadanje) ili prolaz (izlučivanje) žučnih kamenaca. Rowachol povećava proizvodnju žuči i opušta žučne kanale. To pomaže u smanjenju bolnih grčeva žučnih kanala te olakšava postojećim žučnim kamencima da izađu (budu istisnuti) sa žuči van. Rowachol kapsule namijenjene su za primjenu kod odraslih.

**Prije upotrebe Rowachola neophodan je pregled kod liječnika specijalista koji će postaviti dijagnozu i savjetovati Vas oko uzimanja lijeka.**

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowachol?**

**Nemojte uzimati Rowachol** ako ste alergični (preosjetljivi) na neku djelatnu tvar:  $\alpha$ -pinen,  $\beta$ -pinen, mentol, menton, kamfen, borneol, cineol ili neki drugi sastojak Rowachola (naveden u dijelu 6).

#### **Upozorenja i mjere opreza**

Recite Vašem liječniku ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi ili lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči.

#### **Djeca**

Ne preporučuje se primjena Rowachol kapsula kod djece.

#### **Drugi lijekovi i Rowachol**

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se dobiju bez recepta. To uključuje sljedeće:

- lijekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi npr. varfarin)
- lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči (posavjetujte se sa Vašim liječnikom u vezi toga)

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Primjena lijeka tijekom trudnoće ili dojenja se ne preporučuje.

Ako ste trudni ili dojite možete uzeti Rowachol samo na savjet Vašeg liječnika.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Mala je vjerojatnost utjecaja Rowachola na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

### **Rowachol sadrži natrijev etilparahidroksibenzoat i natrijev propilparahidroksibenzoat.**

Može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

## **3. Kako uzimati Rowachol?**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni provjerite sa Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Rowachol kapsula se mora progutati cijela. Ne grizite i ne žvačite kapsule.

### **Uobičajena doza za odrasle**

Jedna do dvije kapsule tri puta na dan prije jela.

### **Primjena u djece**

Ne preporučuje se primjena Rowachol kapsula kod djece.

### **Ako uzmete više Rowachola nego što ste trebali**

Ako ste uzeli više kapsula nego što ste trebali, razgovarajte sa Vašim liječnikom ili ljekarnikom koji će poduzeti potrebne mjere.

Kod predoziranja može doći do iritacije želuca što može prouzročiti mučninu, povraćanje i dijareju.

### **Ako ste zaboravili uzeti Rowachol**

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Povremeno se može pojaviti blagi okus po pepermintu. To se može ublažiti ili izbjeći uzimanjem lijeka na prazan želudac pola sata prije jela. Zabilježeni su blaži slučajevi preosjetljivosti na lijek koji su se očitovali reakcijama na koži. Kod manjeg broja bolesnika zabilježena je bol u ustima i ulceracije sluznice u ustima.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Rowachol?**

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nemojte upotrebljavati Rowachol nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Rowachol sadrži?**

Djelatna tvar u svakoj želučanootpornoj kapsuli, mekoj sadrži:  $\alpha$ -pinen 13,6 mg,  $\beta$ -pinen 3,4 mg, mentol 32,0 mg, menton 6,0 mg, borneol 5 mg, kamfen 5,0 mg, cineol 2,0 mg. Preostali sastojak je djevičansko maslinovo ulje.

Ovojnica kapsule sadrži: želatinu; glicerol 85%; natrijev etilparahidroksibenzoat (E215); natrijev propilparahidroksibenzoat (E217); natrijev bakar klorofilin (E 141) (100% topljiv u vodi)

### **Kako Rowachol izgleda i sadržaj pakiranja?**

Rowachol kapsule su zelene, ovalne, meke želatinske, želučanootporne kapsule koje sadrže zelenkasto žutu otopinu s jakim aromatičnim mirisom.

Svako pakiranje sadrži 50 kapsula u blister pakiranju, u kutiji.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

Rowa Pharmaceuticals, Ltd.  
Newtown, Bantry, Co. Cork  
Irska

### **Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**

Medical Intertrade d.o.o.  
Dr. Franje Tuđmana 3  
10 431 Sveta Nedelja  
Tel: 01/3336036

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2019.**